

Листок-вкладыш – информация для пациента

Экофуцин® ДУО, 300 мг + 100 мг, суппозитории вагинальные

Действующие вещества: лактулоза + натамицин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Экофуцин® ДУО, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Экофуцин® ДУО.
3. Применение препарата Экофуцин® ДУО.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Экофуцин® ДУО.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Экофуцин® ДУО, и для чего его применяют

Препарат Экофуцин® ДУО представляет собой комбинацию активных действующих веществ – пребиотика лактулозы и противогрибкового антибиотика натамицина.

Натамицин – противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает фунгицидное (подавляющее развитие грибковых поражений) действие.

Лактулоза – синтетический дисахарид, который не встречается в природе. В лекарственном препарате данное соединение выполняет функцию субстрата (питательной среды) для развития молочнокислых бактерий (лактобактерий), являющихся основным компонентом здоровой микрофлоры влагалища.

Показания к применению

Препарат Экофуцин® ДУО показан при вагинитах, вульвитах, вульвовагинитах, вызванных главным образом грибами рода *Candida*.

Способ действия препарата Экофуцин® ДУО

Лечебный эффект препарата Экофуцин® ДУО обусловлен входящими в его состав действующими веществами.

Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. Активен в отношении большинства патогенных дрожжеподобных грибов (особенно *Candida albicans* и *non-albicans*), дрожжей (*Torulopsis* и *Rhodotorula*), а также других патогенных грибов (*Aspergillus*, *Penicillium*). Менее активен в отношении дерматофитов (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*).

Не влияет *in vitro* на грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

Лактулоза как пребиотическое вещество способствует увеличению количества полезных лактобактерий и нормализации уровня pH влагалища, что приводит к подавлению роста патогенных и условно-патогенных бактерий, восстановлению иммунитета – важных факторов, препятствующих развитию рецидивов грибковых инфекций.

Натамицин и лактулоза не проникают в кровоток, не оказывают системного действия.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Экофуцин® ДУО

Противопоказания

Не применяйте препарат Экофуцин® ДУО:

- если у Вас аллергия на натамицин, лактулозу или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Экофуцин® ДУО проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При вагинальной аппликации под действием температуры тела суппозитории превращаются в пенистую массу, что способствует равномерному распределению действующих веществ по слизистой оболочке влагалища.

В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и в случае выявления кандидозного поражения провести курс лечения натамицином. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.

Если клинические признаки инфекции сохранятся после завершения лечения, следует провести повторное микробиологическое исследование с целью подтверждения диагноза.

При лечении вагинальных инфекций препарат нельзя применять во время менструации, лечение целесообразно начинать после менструации.

Другие препараты и препарат Экофуцин® ДУО

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Лекарственное взаимодействие препарата с другими лекарственными препаратами не описано.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность и грудное вскармливание

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.

Натамицин и лактулоза не проникают через не поврежденные плодные оболочки к плоду и не оказывают на него влияния.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

3. Применение препарата Экофуцин® ДУО

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

По 1 суппозиторию 1 раз в сутки на ночь в течение 3-6 дней.

Путь и (или) способ введения

Интравагинально. Суппозиторий освобождают от контурной упаковки и вводят заостренным концом, находясь в положении лежа, по возможности глубоко во влагалище.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

Во время менструации применение суппозитория прерывают.

Если Вы применили препарат Экофуцин® ДУО больше, чем следовало

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Если Вы забыли применить препарат Экофуцин® ДУО

Если Вы пропустили время применения препарата, следует ввести его как можно скорее. При этом не стоит применять сразу две дозы (2 суппозитория).

Если Вы прекратили применение препарата Экофуцин® ДУО

Если препарат Вам назначил врач для лечения, не прекращайте его применение раньше срока, даже если Вы почувствовали себя лучше. Если Вы перестанете применять препарат слишком рано, симптомы заболевания могут появиться снова.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При местном применении возможно легкое раздражение и ощущение жжения в месте введения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщения государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Экофуцин® ДУО

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует уничтожать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Экофуцин® ДУО содержит

Действующими веществами являются лактулоза и натамицин.

Каждый суппозиторий содержит 300 мг лактулозы, 100 мг натамицина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: макрогола глицерилгидроксистеарат, кремния диоксид коллоидный, жир твердый.

Внешний вид препарата Экофуцин® ДУО и содержимое упаковки

Суппозитории вагинальные.

Суппозитории торпедовидной формы от почти белого до светло-коричневого цвета. Допускаются вкрапления белого цвета. Допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

По 1, 2, 3, 4, 5 или 6 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ. По 1 контурной ячейковой упаковке по 1, 2 суппозитория, или по 1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок по 3 суппозитория, или по 1, 2, 3, 4 контурные ячейковые упаковки по 4 суппозитория, или по 1, 2, 3 контурные ячейковые упаковки по 5 суппозитория, или по 1 контурной ячейковой упаковке по 6 суппозитория вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

АО «АВВА РУС»

121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9.

Тел.: + 7 (495) 956-75-54.

info@avva-rus.ru

Производитель

Российская Федерация

АО «АВВА РУС»

Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская д. 53А.

Все претензии потребителей следует направлять держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «АВВА РУС»

121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9.

Тел.: + 7 (495) 956-75-54.

avva-rus.ru

esofucin.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://ees.eaeunion.org/>.